Une coccinelle nuisible aux cultures d'aubergine

Chnootriba (=Epilachna) pavonia ou "Coccinelle malgache" : savoir la reconnaître pour mieux protéger ses cultures.



Contacts: Pauline Georges (pauline.georges@educagri.fr; +33 786188057) | uliette Soulezelle (juliette.soulezelle@educagri.fr; +262 639294065)

FICHE TECHNIQUE

A écraser systématiquement

(en faisant attention à ne pas la confondre avec une coccinelle prédatrice, voir p.2)










Les larves à des stades plus avancés





La coccinelle malgache adulte est plutôt de grande taille (1 cm), bien ronde, orange avec des point noirs et une tâche grisâtre sur le pronotum et la partie antérieure et postérieure des élytres.

Elle a des yeux noirs bien visibles, des pattes oranges et présente un aspect "duveteux" caractéristique.











Les larves et les adultes se nourrissent des feuilles d'aubergine et leurs dégâts se repèrent grâce à **l'aspect** "dentelle" qu'elles laissent sur les feuilles attaquées. L'attaque peut être fatale sur des jeunes plants.



Les œufs



Les œufs sont jaunes, de forme oblongue (plus longs que larges) et ont la caractéristique d'être "à étage".





Un des seuls moyens efficaces pour limiter la propagation de la coccinelle malgache est d'<u>éliminer systématiquement</u> les individus adultes (et les larves et les œufs pour les plus aguerris en identification) en les écrasant avec les doigts. Attention, il ne faut surtout pas les confondre avec les autres coccinelles qui, elles, sont des prédatrices et donc des <u>alliées pour les agriculteurs (voir page 2). Il n'y a aucun produit phytosanitaire dédié.</u>





















Une coccinelle nuisible aux cultures d'aubergine

Chnootriba (=Epilachna) pavonia ou "Coccinelle malgache" : savoir la reconnaître pour mieux protéger ses cultures.



Contacts: Pauline Georges (pauline.georges@educagri.fr; +33 786188057) Juliette Soulezelle (juliette.soulezelle@educagri.fr; +262 639294065)

FICHE TECHNIQUE




ECRASER



Les coccinelles prédatrices et leurs larves se nourrissent des ravageurs des cultures comme les pucerons, les aleurodes, les cochenilles ou encore les oïdiums.

Les coccinelles prédatrices Auxiliaires des cultures et alliées des agriculteurs






Indice: si la coccinelle se trouve dans un foyer de pucerons, d'aleurodes ou cochenilles, il y a de forte chance qu'il s'agisse d'une coccinelle prédatrice!

Pour aller plus loin

Pour les plus aguerris en identification, il est aussi possible d'écraser les œufs et les larves de Chnootriba pavonia pour augmenter l'efficacité de l'éradication, mais la différenciation avec de potentiels auxiliaires des cultures est plus difficile. Attention à ne pas confondre avec les larves de syrphes (prédatrices de pucerons), ou avec les larves et les œufs d'autres coccinelles :



Larve de syrphes



A FAVORISER

























