

L'élevage du veau à Mayotte

CONTACTS : Chouanibou Youssouffi ⁽¹⁾, Christian Rakotoarivivo⁽¹⁾, Eric Cardinale⁽²⁾,

(1) GDS 976 Mayotte, Ruelle Fargeon Quartier Dicelli Coconi, 97670 OUANGANI,

(2) CIRAD La Réunion, Station de la Bretagne, BP20, 97408 Saint Denis Cedex 9


De la naissance au sevrage

La performance d'un bovin adulte est liée à son alimentation depuis sa naissance. Le stade veau est une période cruciale qui conditionne l'obtention d'un animal en bonne santé et productif.

L'importance du colostrum

L'immunité du veau

- ❖ Le nouveau-né est dépourvu de défenses immunitaires contre les maladies environnantes. C'est le colostrum qui va lui procurer l'immunité nécessaire depuis sa naissance jusqu'à quelques mois de vie (entre 5 et 7 mois).
- ❖ Les effets du colostrum sont optimaux durant les 1ères heures suivant le vêlage. L'efficacité du « premier lait » diminue avec le temps.
- ❖ **Réussir la conduite des 0-6 mois, c'est assurer la longévité de l'animal et optimiser son potentiel de production à l'âge adulte.**



Les besoins du veau

Le rationnement

- ❖ Pendant les 2 premiers mois le veau doit avoir une alimentation liquide (lait) et solide (fourrage, concentré...).
- ❖ Durant la 1ère semaine de vie, seule la caillette est fonctionnelle.
- ❖ Au bout de la 2^e semaine, le veau doit être alimenté avec 5L de lait/jour en complément de fourrage et du concentré. L'objectif est de permettre au jeune bovin à un mois d'âge de consommer au minimum 1kg de concentré/jour et du fourrage.
- ❖ Avec cette méthode, le sevrage peut se faire à 2 mois.

La prophylaxie du veau

- ❖ A la naissance du veau, son nombril doit être désinfecté au chlorure d'iode et il doit rester dans un lieu sec et aéré. Il est conseillé de pailler la literie.
- ❖ Le lait de vache contient des œufs de parasites internes. Il est conseillé de vermifuger le nouveau né au 10ème jours de sa naissance et à deux mois pour ne pas perturber sa croissance.

Besoins alimentaires du veau

Semaine	Nb repas par jour	Volume lait par repas	Nature alimentation
1	2	2	Eau + foin / paille + concentré à volonté
2		3	
3		4,5	
4	1	4,5	
5		4,5	
6		4,5	
7		4,5	
8		4,5	
9		4,5	



Conclusion

25% des veaux meurent dans les élevages mahorais tous les ans. Les raisons sont les conditions d'élevages non adaptées, les maladies mais surtout l'alimentation. Le respect des préconisations ci-dessus permettra de sauver une grande partie.

Sources : <http://www.web-agri.fr/conduite-elevage/alimentation/article/reduction-du-temps-de-travail-d-alimentation-des-veau-et-genisses-1172-132629.html>,
<http://www.fidocl.fr/content/elevage-des-genisses-de-0-6-mois-une-conduite-de-precision-pour-gagner-du-temps-et-de>,