ARP ASSOCIATION REUNIONNAISE de PASTORALISME
RITA RÉUNION
Réseau d'innovation et de transfert agricole

L'écho des prairies

N° 5 - octobre 2019

LA POUSSE DE L'HERBE DE SEPTEMBRE



La croissance de l'herbe a augmenté, en septembre, dans les secteurs de la Plaine des Cafres et du Sud zone médiane, en raison d'une augmentation de la pluviométrie. Dans les Hautes de l'Ouest, la croissance a continué à ralentir.

Météo de septembre

Secteur	Plaine des Cafres	Sud zone médiane	Hauts de l'Ouest
Pluviométrie *(mm)*	54	147	36
Température *(C°)*	11 *(3 - 20)*	15 *(8 - 24)*	14 *(7 - 26)*

C'est le moment d'apporter du phosphore, pour recharger le sol avant le redémarrage de la végétation. Pour ceux qui souhaitent réaliser un sursemis en novembre, c'est le moment de préparer vos prairies, et de contacter l'ARP pour monter un dossier.

LE SUIVI

Il est réalisé toutes les semaines, dans 6 élevages, sur les mêmes lots de pâtures. La **hauteur d'herbe** moyenne des prairies est mesurée à l'aide d'un **herbomètre.** Cela permet d'estimer **le stock d'herbe disponible** le jour de la mesure. Ce suivi hebdomadaire permet le calcul d'une **croissance journalière**, et d'estimer l'herbe à venir et **la surface à offrir au troupeau.**

Retour sur les ABC prairies de septembre

« Les clés d'un bon pâturage tournant»

Le 25 et 26 septembre, deux animations bout de champ ont été réalisées à Trois Bassins et au Guillaume. Elles ont réunie une dizaine d'éleveurs chacune autour du pâturage tournant. Ce fut un bon moment d'échanges sur la gestion du pâturage, les temps de rotations, la fertilisation. Trois ABC seront organisées sur ce thème, en novembre et décembre, à la Plaine des Cafres et au Tampon.

LES CLES POUR RÉUSSIR SON SURSEMIS

La première campagne de sursemis de 2019 a été globalement une réussite. Cependant il y a eu quelques « ratés », en raison de mauvaises pratiques avant et/ou après le sursemis. Petit rappel des règles à respecter pour réussir son sursemis.

Bien préparer la prairie avant le sursemis, pour faciliter la levée

Avant le semis, il faut préparer la prairie en place de sorte à affaiblir le couvert pour qu'il laisse sa place aux nouvelles espèces qui vont être semées. Quelques jours avant le sursemis, il faut faire un pâturage ras et un broyage à 2/3 cm, ou une fauche la plus rase possible, surtout sur une prairie de kikuyu. Si la parcelle est envahie de plantes indésirables *(plus de 30 % de la surface)*, il est conseillé de faire un désherbage total, mécanique ou chimique. En présence de plantes très agressives, comme les z'herbes naturelles *(agrostis)* ou chiendent-fil-de-fer *(Cynodon dactylon)*, un désherbage sélectif est fortement conseillé, en faisant attention au délai d'attente avant semis.

Adapter la fertilisation pour favoriser l'implantation des plantules

En amont, vérifiez le pH du sol de la prairie, avec un conseiller de l'ARP. Un sol trop acide va pénaliser la levée des plantules. Dans ce cas un chaulage est obligatoire. Il faut apporter du phosphore *(P)* et du potassium *(K)*, avant ou lors du semis, pour favoriser le développement des plantules et de leurs racines. Attendez le stade 3—4 feuilles pour le premier apport d'azote. Il ne faut pas dépasser un apport de 30 unités/ha, car un apport trop important va stimuler la repousse du couvert en place, ce qui risque d'étouffer les plantules. On évitera d'épandre du lisier dans les semaines qui suivent, car il y a un risque de former une croûte qui va faire barrière à la levée des plantules.

Bien gérer les 1ères exploitations pour assurer le maintien du nouveau couvert

La première exploitation doit se faire à un stade précoce pour que le couvert en place n'étouffe pas les plantules. Il est possible de faire pâturer par plage de 3 à 4 heures dès 60 jours. Cela va favoriser le tallage des pieds. Il faut laisser le temps au nouveau couvert de s'installer. Lors des premières exploitations, la fertilisation azotée doit être limitée, pour laisser le temps au nouveau couvert de s'installer et ne pas favoriser le couvert en place *(pâture : 30 u N/ha/ex ; fauche : 50 u N/ha/cpe)*.

Hauteur de pâture

Hauteur de fauche

De nouvelles Semences sont disponibles à l'ARP !!!

Dactyle australis
Variété Lazuly

Fétuque australis
Variété Finesse Q

Ray Grass
diploïde pérenne
Variété Tenacity

A VOS AGENDAS !!!!

Le #Mooc « Le bien-être des animaux d'élevage » est ouvert !

Un cours en ligne pour mieux comprendre le bien-être animal et être en mesure de l'évaluer pour l'améliorer dans les élevages. Début des cours le 14 octobre.

Pour s'inscrire

VOS CONTACTS :

CONSEIL ET EXPERTISE :

Emmanuel LEGENDRE - 0692 56 92 19

Fabien DUTREUIL - 0692 67 10 18

Eddy LAYEMARD - 0692 65 51 74

LABORATOIRE DES FOURRAGES :

Yoann PELLIER - 0692 70 50 93

INNOVATION & TRANSFERT :

Maëva MIRALLES - 0692 57 98 55

Pour rester informé, suivez nous sur le net :

www.arp.re

Rédaction & Mise en page : M. MIRALLES-BRUNEAU , E. LEGENDRE - Crédits photos : ARP - Contact : maeva.miralles@arp.re

RITA Réseaux d'innovation et de transfert agricole dans les outre-mer · cirad LA RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT · l'Europe s'engage à La Réunion avec le FEADER · UNION EUROPEENNE · DÉPARTEMENT DE LA Réunion