Fiche technique

Anredera leptostachys (Moq.) Steenis

Glycérine / Glisérin

Famille Basellacées
Genre : Anredera
Espèce : *Anredera leptostachys*
Origine : Amérique centrale et subtropicale
Colombie – Antilles – Floride – Texas

RITA MARTINIQUE
Réseau d'innovation et de transfert agricole

AGRICULTURES & TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE MARTINIQUE

parm

Description

- Plante herbacée vivace à tiges lianescentes de couleur verte à rosâtre, mesurant entre 3 et 6 mètres
- Feuilles alternes de forme ovale -elliptique
- Fleurs : groupées en grappes de couleur blanche
- Reproduction par tubercule

Données culturales

- Surface cultivée : 15 m²
- Localisation : François
- Type de sol : ferralitique
- Première récolte : 2,5 mois
- Plants : tubercules de 10 cm de long en moyenne.
- Plantation : distance entre les plants : 0,60 m
- Distance entre les lignes : 0,80 m
- Densité : 30 000 plants/ha
- Culture palissée : poteaux plantés tous les 2,5 mètres sur la ligne
  2 rangées de fil espacées de 0,5 mètre sur le poteau
- Irrigation : par aspersion en début de culture
- Fertilisation : 20 tonnes de compost/ha avant plantation.
- Désherbage : manuel tous les 35 jours, jusqu'à couverture complète de la planche de culture.
- Maladies/ Ravageurs : non observés
- Délai de reprise : 1 mois
- Stade de récolte : tiges feuillues et tiges feuillues + fleurs

Bibliographie

BEUZE R, 1973. La santé par les plantes des Antilles françaises. E. Désormaux, Pointe-à-Pitre, Guadeloupe.

DUSS R.-P., 1897. Flore phanérogamique des Antilles françaises (Martinique et Guadeloupe). Réédition S.D.C. Fort-de-France, 1972, 2 tomes.

LONGUEFOSSE JL, NOSSIN E, 1996. Medical ethnobotany survey in Martinique. Journal of Ethnopharmacology 53(3), 117-142.

LONGUEFOSSE JL, NOSSIN E, 1995. Enquête TRAMIL. Association pour la valorisation des plantes médicinales de la Caraïbe AVPMC, Fort de France, Martinique.

LONGUEFOSSE JL, 2007. Plantes médicinales caribéennes. Tome 1. Editions Orphie.

OUENSENGA C., 1983-«Plantes médicinales et remèdes créoles»- Ed. Desormeaux.1983

Données de transformation primaire

Poids frais mis à sécher :	45 kg
Humidité de l'échantillon frais :	89,76 %
Poids sec :	4,20 kg
Humidité de l'échantillon sec :	11,96 %
Rendement de séchage :	9 %
Durée de séchage à 50°C	24 h
Rendement frais parcelle :	5,17 kg/m²
Rendement sec parcelle :	0,48 kg/m²

Usages traditionnels en Martinique

Dans les Antilles françaises, les feuilles sont utilisées en bain comme vulnéraire, relaxant (Beuze, 1973) et contre les dermatoses (Longuefosse & Nossin, 1996). Elles sont appliquées en cataplasme pour traiter les maladies de la peau (Ouensanga, 1983 ; Longuefosse & Nossin, 1996) et les brûlures (Ouensanga, 1983).

Les jeunes feuilles et tiges sont conseillées en bains adoucissants contre les inflammations (Duss, 1897), notamment contre les boutons de chaleur (Ouensanga, 1983), la rougeole (Longuefosse & Nossin, 1995) et les démangeaisons (Longuefosse, 2007). La plante est recommandée en décoction orale pour les mêmes indications (Longuefosse, 2007).

Remarque : étude en cours, données sur une année et sur un site

Infographie Cirad, Martine Duperrin, 2014 — © photo Chambre d'Agriculture Martinique